

ICAR

Question sur : L'adaptation de la posologie chez le patient insuffisant rénal
 La néphrotoxicité des médicaments
 Les interactions avec les immunosuppresseurs

À nous adresser par :

Fax : + 33 (0)1 42 17 72 12 ou E-mail : icar.nephro@psl.ap-hop-paris.fr

la réponse vous parviendra sous 24 heures

Médicament(s) concerné(s) :

Nom du patient : Poids (kg) :
Sexe du patient : Taille (cm) :
Age ou Date de Naissance : Créatininémie ($\mu\text{mol/l}$ ou mg/l) :
Pathologie motivant la prescription du(des) médicament(s) :
Posologie et voie d'administration :

Si le patient est dialysé

Type de dialyse (HD / DP) et Fréquence des séances :
Type de dialyseur / membrane :

Si le patient est transplanté

Quel organe ?
Quel(s) immunosuppresseur(s) ?

Si la question concerne la néphrotoxicité

Posologie : Initiale : Entretien :
Durée d'exposition au traitement :
Délai entre l'introduction du médicament et l'apparition des manifestations néphrotoxiques :
Créatininémie ($\mu\text{mol/l}$ ou mg/l) : avant après

Votre Nom :
Service et Institution :
Adresse :
Téléphone :
Fax (indispensable) :
E-mail :

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre par téléphone au

+ 33 (0)1 42 17 72 30

Comité Scientifique
Y. Berland, Marseille
G. Deray, Paris
M. Laville, Lyon

Coordinateur National
V. Launay-Vacher, Paris

Coordinateurs Régionaux
P. Brunet, Marseille
JP. Fauvel, Lyon
S. Karie, Paris